

带状疱疹ワクチン 比較表

	生ワクチン(ビケン)	不活化ワクチン(シングリックス)
接種回数	1回	2回 (2回目は1回目の接種から2か月後、遅くとも6か月後までに接種する) ※例外として、医師と相談のうえ、1か月に短縮できる場合があります
接種方法	皮下注射	筋肉内注射
有効性	50～59歳:69.8% 60～69歳:64% 70～79歳:41% 80歳以上 :18%	50～59歳:96.6% 60～69歳:97.4% 70～79歳:91.3% 80歳以上 :91.4%
予防効果	5～7年程度	10年以上 (11年目以降は延長試験を実施中)
副反応	<p>■頻度10%以上の副反応 発赤(44.0%)、掻痒感(27.4%)、熱感(18.5%)、腫脹(17.0%)、疼痛(14.7%)、硬結(13.5%)</p> <p>■重大な副反応(いずれも頻度不明) アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎</p>	<p>■頻度10%以上の副反応 疼痛(79.1%)、発赤(37.4%)、腫脹(24.2%)、筋肉痛(36.9%)、疲労(34.6%)、頭痛28.3%)、悪寒(21.4%)、発熱(16.7%)、胃腸症状(12.0%)</p> <p>■重大な副反応(いずれも頻度不明) ショック、アナフィラキシー</p>
接種費用	8,000円～9,000円	1回あたり 20,000円～25,000円
助成金額	4,000円	10,000円/回 2回を上限とする

带状疱疹ワクチンは任意接種のため、医療機関ごとで接種費用が異なります。

<引用文献>

Zostavax の SPS・STPS・LTPS 試験(50歳代は ZEST 試験)(国内での有効性について試験を行っていないため、本質的に同じワクチンとされている Zostavax の試験結果から引用)、Shingrix Zoster-006・022・049試験、医薬品添付文書